

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПТИЦЕВОДСТВА

ANIMALPROFI



ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
с контактами профессионалов
животноводства со всей страны



БАЗА ЗНАНИЙ
видеолекции, презентации,
полезная литература и т. д.



ВОПРОС ЭКСПЕРТУ
консультации ведущих
экспертов отрасли

Скачайте приложение в
App Store, Google play

или общайтесь на сайте
WWW.ANIMAL-PROFI.RU


Взвешенный подход
к лечению и профилактике



Доксилокс® Feed

Порошок для перорального применения

Водорастворимый доксициклин в форме порошка
для лечения и профилактики заболеваний
птиц и свиней





Доксилокс® Feed



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Представитель тетрациклинов последнего поколения
- Выгодная стоимость курса
- Удобный способ задачи поголовью

ОПИСАНИЕ

Водорастворимый доксициклин в форме порошка для лечения и профилактики заболеваний птиц и свиней.

СОСТАВ



== 500 мг доксициклина гиклат

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Доксициклин обладает широким спектром антибактериального действия в отношении многих микроорганизмов, в том числе:

- грамположительных: аэробных кокков – *Staphylococcus* spp. (в том числе, продуцирующих пенициллиназу), *Streptococcus* spp. (в том числе *Streptococcus pneumoniae*), аэробных спорообразующих бактерий – *Bacillus anthracis*, аэробных неспорообразующих бактерий – *Listeria monocytogenes*, анаэробных спорообразующих бактерий – *Clostridium* spp.
- грамотрицательных: аэробных кокков *Neisseria gonorrhoeae*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, аэробных бактерий – *Escherichia coli*, *Shigella* spp., *Salmonella* spp., *Enterobacter* spp., *Klebsiella* spp., *Bordetella* spp., *Haemophilus* spp., *Pasteurella multocida*, а также *Rickettsia* spp., *Treponema* spp., *Mycoplasma* spp. и *Chlamydia* spp.

ДОЗИРОВКА

0,4 г препарата/
10 кг массы птицы
3-5 дней



0,2 г препарата/
10 кг массы животного
5 дней

ОГРАНИЧЕНИЯ



8 суток



12 суток

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная индивидуальная чувствительность животного к тетрациклинам. Запрещается применение лекарственного препарата животным с выраженной почечной и печеночной недостаточностью, а также курам-несушкам и ремонтному молодняку кур старше 16-недельного возраста в связи с накоплением доксициклина в яйцах.



Для точного расчета необходимого объема препарата **Доксилокс Feed** воспользуйтесь **КАЛЬКУЛЯТОРОМ ДОЗИРОВОК** на сайте WWW.NITA-FARM.RU