


Применение препарата Сепранол совместно с антибиотиком при минимальном сроке курса лечения позволяет добиться выздоровления животных в **95%** случаев



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышение эффективности терапии
- Быстрое восстановление продуктивных качеств животного

Сепранол + Цефтонит³

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ЭНДОМЕТРИТОВ

1 день

Цефтонит	Подкожно 1мл/50кг
Сепранол	Внутриматочно 2 таблетки

2 день

Цефтонит	Подкожно 1мл/50кг
Сепранол	Внутриматочно 2 таблетки

3 день

Цефтонит	Подкожно 1мл/50кг
----------	-------------------

³ Цефтонит (цефтиофур) – антибактериальный препарат широкого спектра действия без ограничения по молоку



Сепранол[®]


Таблетки для внутриматочного введения

Забота о будущем

Профилактика и лечение
эндометритов



Хлоргексидин, пропранолол





Сепранол®

Забота о будущем



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективен против большинства бактерий, а также грибов Candida
- Предотвращает послеродовые эндометриты за счет широкого спектра действия и сокращающих матку свойств при профилактических обработках
- Отсутствие антибиотиков в составе
- При комплексном лечении сокращает сроки выздоровления животного
- Воздействует на всю полость матки благодаря пенообразующей форме
- Возможность применения в виде раствора

ОПИСАНИЕ

Безопасный антибактериальный акушерско-гинекологический препарат, не являющийся антибиотиком, для профилактики и лечения эндометритов коров.

СОСТАВ

1 таб.
СЕПРАНОЛ

60 мг хлоргексидина гидрохлорид
343 мг пропранолола гидрохлорид

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Хлоргексидина гидрохлорид, входящий в состав препарата Сепранол, обладает широким антибактериальным спектром действия в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, простейших и грибов. Обладает противовоспалительным действием, улучшает пролиферативные процессы в половых органах. Пропранолола гидрохлорид стимулирует активность матки и является бета-адреноблокатором адренорецепторов миометрия.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Сепранол применяют коровам для стимуляции отделения последа, профилактики и лечения острого послеродового эндометрита, а также лечения эндометрита, вызванного микроорганизмами, чувствительными к хлоргексидина гидрохлориду.

Рекомендуем применять **Сепранол** совместно с гелем для ветеринарных манипуляций на основе природных компонентов - **Гелерон**.

Гелерон

Легкость скольжения

250 мл
5 л

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ


Вид животного	Показания	Дозировка	Длительность курса
КРС	для отделения последа	2 таблетки внутриматочно	Однократно
	для профилактики острых эндометритов		Однократно через 2-4 часа после отделения последа
	для терапии острых послеродовых эндометритов		Двукратно с интервалом 24 часа
	для терапии хронических эндометритов (в том числе грибковой этиологии)		в течение 2-5 дней с интервалом 24 часа

При закрытии шейки матки и невозможности введения суппозиториев, рекомендуется использовать раствор препарата.

Для раствора: 2 таблетки на 150-200 мл стерильной воды или физраствора, предварительно подогреть до 40° С


ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СЕПРАНОЛ

Сепранол обладает 100% эффективностью в профилактике послеродовых эндометритов¹



¹ Профилактику возникновения послеродовых эндометритов изучали на коровах черно-пестрой «Венгерской» породы в возрасте 3- 5 лет, средней упитанности и массой тела 450 кг на базе хозяйства Марковского района Саратовской области.

Препарат Сепранол, образуя обильную пену в полости матки, активно воздействует на слизистую оболочку, заполняя всю область поражённого органа в отличие от растворов



ОГРАНИЧЕНИЯ

Молоко дойных животных разрешается использовать в пищевых целях не ранее чем через 48 часов после последнего введения препарата Сепранол.

Убой животных на мясо разрешается не ранее чем через 48 часов после последнего применения препарата Сепранол. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

ФОРМА ВЫПУСКА

Сепранол упаковывается в пачки по 5 блистеров (в каждом блистере 2 таблетки).

Сравнение стоимости обработок КРС в хозяйстве с поголовьем 1000 дойных коров при лечении и профилактике

Схема обработки	Дозировка	Курс применения	Стоимость курса применения ² , руб.
Профилактика препаратом Сепранол	2 таблетки	однократно	85 610
Лечение зарубежным цефалоспориновым антибиотиком	1мл/50кг	5 дней	675 000
При лечении гнойных эндометритов в схеме Цефтонит + Сепранол в осложненных случаях	1мл/50кг + 2 таблетки	3 дня (Цефтонит) + 2 дня (Сепранол), общий курс лечения 3 дня	436 244

² Расчет сделан на основе рекомендуемых цен производителей