

Рекомендации по применению добавки кормовой «Реплевак-БЭТ»

Добавка кормовая «Реплевак-БЭТ» — уникальный, мощный комплекс для остановки диареи у молодняка сельскохозяйственных животных, позволяющий быстро облегчить состояние животного и сохранить им жизнь. Останавливает диарею за 24 часа. Стабилизирует уровень рН, обеспечивает защиту полезной микрофлоры ЖКТ.

«Реплевак-БЭТ» останавливает диарею и обеспечивает защиту бактерий, отвечающих за нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта.

1 Общие сведения и свойства

1.1 «Реплевак – БЭТ» (далее кормовая добавка) представляет собой однородную сыпучую порошкообразную смесь от светло – желтого до желтого цвета.

1.2 Кормовая добавка содержит:

- пребиотик и пробиотик (связывают в кишечнике патогенные бактерии, не позволяя им закрепиться на стенках кишечника, стимулируют рост полезной микрофлоры, способствуют нормализации биоценоза кишечника и повышению иммунитета животных);
- глюкозу и лактозу (источники энергии);
- противомикробный комбинированный препарат (действует бактерицидно в отношении грамотрицательных, грамположительных бактерий, эймерий и хламидий);
- электролиты (предотвращают потерю жидкости в организме и ацидоз);
- микроэлементы и витамины (стимулируют иммунитет);
- натуральную аминокислоту, производную глицина (осмолит, гепатопротектор, донор метильных групп).

Показатели качества:

Обменная энергия КРС, МДж/кг	10,4
Натрий, г/кг	47,9
Калий, г/кг	18,3

Добавлено биологически активных веществ:

Витамин А, тыс.МЕ/кг	100	Пиридоксина гидрохлорид (В ₆), мг/кг	20
Витамин Д ₃ , тыс.МЕ/кг	10	Витамин В ₁₂ , мг/кг	0,5
Витамин Е, мг/кг	500	Витамин В _с , мг/кг	0,5
Тиамин мононитрат (В ₁), мг/кг	20	Витамин К ₃ , мг/кг	5,0
Са-d-пантотенат (В ₃), мг/кг	30	Витамин Н (биотин), мг/кг	0,25
Бетаин, мг/кг	14 400	Йод, мг/кг	0,5
Никотиновая кислота (В ₅), мг/кг	90	Селен, мг/кг	2,5

1.3 Добавку фасуют в пакеты из металлизированной полиэтиленовой пленки по 200 г.

1.4 Кормовую добавку хранят в упаковке предприятия-изготовителя, в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше плюс 25°С. После вскрытия пакета избегать попадания влаги.

1.5 Срок годности - 5 месяцев от даты изготовления при соблюдении условий хранения.

2 Порядок применения

2.1 «Реплевак - БЭТ» применяют с целью пополнения организма витаминами, минералами, энергией и восполнение солевых потерь и жидкости при электролитных дисбалансах и диареях, а так же восстановления нормальной микрофлоры кишечника и повышения общей резистентности организма животных.

Наиболее эффективно применение кормовой добавки при первых признаках нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта.

2.2 Кормовую добавку применяют молодняку крупного рогатого скота до 75 дневного возраста, при первых признаках нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта, **два раза в сутки по 100 г** (половина содержимого пакета) в течение 2 - 3 дней. Суточная доза составляет 200 г на голову массой 40-50 кг. При тяжёлых случаях течения заболеваний суточная доза увеличивается до 300 г.

Перед применением 100 г (одну дозу) «Реплевак - БЭТ» растворяют в 1,5 – 2 литрах теплой (35-40°C) кипяченой воды. Кормовая добавка хорошо растворяется в теплой воде, в растворе возможно наличие небольшого количества нерастворенных компонентов, что не влияет на качество добавки, т.к. эти компоненты проявляют свою активность в ЖКТ.

После растворения выпаивается животным посредством сосковых поилок, периодически встряхивая содержимое поилок. При выпойки из ведер необходимо взмучивать раствор, для предотвращения оседания компонентов и следить за полнотой выпаивания.

После растворения добавку необходимо использовать в течение 2-х часов.

2.3 При применении кормовой добавки «Реплевак-БЭТ» исключают выпойку молока, ЗЦМ.

2.4 В рекомендуемых дозах кормовая добавка не оказывает побочных явлений.

2.5 Противопоказано применение животным с повышенной индивидуальной чувствительностью. В случае возникновения аллергической реакции (дерматит, зуд, отек) применение прекращают и назначают десенсибилизирующую терапию (димедрол, тавегил, препараты кальция), рекомендуют обильное питьё.

2.6 Противопоказано совместное применение с лекарственными препаратами, содержащими производные парааминобензойной кислоты (новокаин, анестезин), препаратами серы (натрия тиосульфат и унитиол).

2.7 Не применять животным с развитым рубцовым пищеварением.

2.8 Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через семь суток после последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя мясо используют на корм плотоядным животным.

3 Меры предосторожности

3.1 При работе следует соблюдать общие правила личной гигиены и технику безопасности.

4 Порядок предъявления рекламаций

4.1 В случае несоответствия кормовой добавки требованиям, указанным в настоящей рекомендации и ТНПА, наличия осложнений после применения, применение добавки прекращают и сообщают об этом производителю, а также направляют одновременно три невскрытых единиц фасовки этой серии в научно-производственную лабораторию ООО «Белэкотехника» для подтверждения соответствия нормативным документам по адресу: 222823, Республика Беларусь, Минская обл., Пуховичский р-н, г.п. Свислочь, пер. Промышленный, 9.

5 Полное наименование производителя

5.1 Общество с ограниченной ответственностью «Белэкотехника», пер. Промышленный, 9, 222823, г.п. Свислочь, Пуховичский район, Минская область, Республика Беларусь.