

СОГЛАСОВАНО

Руководитель отдела регистрации

Ашиш Лайф Сайенс Пвт Лимитед

«18» декабря 2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению Катакюр (Catacure)

для стимуляции обменных процессов и неспецифической резистентности
у животных.

(организация-разработчик: Ашиш Лайф Сайенс Пвт Лимитед, 213 Лаксми
Плаза, Нью ЛинкРоуд, Андгери (W), Мумбаи – 400053Индия/Ashish Life
Science Pvt Limited, 213, Laxmi Plaza, New Link Road, Andheri (W), Mumbai
– 400053, India)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Катакюр
(Catacure).

Международное непатентованное наименование: бутафосфан и
цианкоболамин.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Катакюр представляет собой комплексное лекарственное средство,
содержащее в качестве действующих веществ в 1 мл бутафосфан 100 мг и
цианокобаламин 50 мг, а в качестве вспомогательных веществ метил-4-
гидроксibenзоат, а также воду для инъекций.

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную
жидкость розового цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года с даты производства. После вскрытия упаковки – не более 3 месяцев. Запрещается применять Катакюрпо истечении срока его годности.

4. Катакюр выпускают расфасованным по 100млв стеклянные и пластиковые герметично укупоренные флаконыантарного цвета.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5°С до 25°С.

6. Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта.

II. Фармакологические свойства

9. Катакюр относится к комплексным лекарственным средствам, предназначенным для стимуляции обменных процессов и неспецифической резистентности у сельскохозяйственных животных, а также собак.

10. Катозал обладает тонизирующими свойствами, нормализует метаболические и регенеративные процессы, оказывает стимулирующее влияние на белковый, углеводный и жировой обмен веществ, повышает резистентность организма к неблагоприятным факторам внешней среды, способствует росту и развитию животных.

6. Катозал по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местнораздражающего,

сенсibiliзирующего, эмбриотоксического, тератогенного, мутагенного и канцерогенного действия, не обладает кумулятивными свойствами.

III. Порядок применения

11. Катакюр назначают сельскохозяйственным животным, птице, пушным зверям, лошадям и собакам при нарушениях обмена веществ различной этиологии, а также в качестве стимулирующего и тонизирующего средства:

- нарушение обмена веществ, вызванное плохим кормлением, содержанием животных, различными заболеваниями;

- нарушения кормления, развития в следствие заболеваний при выращивании молодняка;

- для стимуляции родовой деятельности и как вспомогательное средство при лечении гипокальцемии;

- послеродовое заболевание, истощение, после тяжелых родов, а так же как вспомогательное средство при лечении бесплодия;

- при титанических синдромах и парезах;

- при ослабленном состоянии у животных;

- при вторичных анемиях, анемиях при гельминтозах;

- для повышения резистентности организма;

- для ускорения и сокращения процесса линьки у птицы, а так же при каннибализме;

- для повышения мышечной активности здоровых животных.

Катакюр широко применяется и для здоровых животных:

- с целью стимулирования роста у щенков собак;

- при метафилактическом лечении для повышения репродуктивной способности и успеха при разведении;

- против нарушений развития с целью вырастить здоровое животное;

- при наличии жизненной слабости и заболеваниях новорожденных, у ослабленных детенышей, а также при всех нарушениях роста очень важно реактивировать нарушенный обмен веществ. В этом случае Катакюр оказывает быстрое, всеобъемлющее и надежное действие.

- для повышения мышечной активности здоровых животных. Катакюр способствует образованию глюкогена, мобилизует запасы энергии и повышает таким образом силу и выносливость животных.

Кроме того, путем активации обмена веществ повышается сопротивляемость организма.

12. Противопоказанием к применению Катакюр является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата.

13. При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами для животных.

14. Препарат рекомендуется к применению для стимуляции родовой деятельности и как вспомогательное средство при лечении гипокальцемии; при послеродовых заболеваниях, истощении, после тяжелых родов, а также как вспомогательное средство при лечении бесплодия; при титанических синдромах и парезах; при ослабленном состоянии у животных (в том числе после родов). Особенности применения у лактирующих животных нет.

15. Катакюр применяют сельскохозяйственным животным, птице, пушным зверям, лошадям и собакам один раз в сутки внутримышечно, подкожно или внутривенно (медленно) птице — перорально с питьевой водой в течение 4-5 дней, в разовых дозах, указанных в таблице.

Таблица

| <i>Вид животного</i> | <i>Доза (мл на животное)</i> |
|---------------------------|------------------------------|
| Взрослые лошади и крупный | 10 – 25 |

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| рогатый скот | |
| Жеребята, телята | 5 – 12 |
| Взрослые овцы и козы | 2,5 – 8 |
| Ягнята, козлята | 1,5 – 2,5 |
| Взрослые свиньи | 2,5 – 10 |
| Поросята-сосуны, подсвинки | 1 – 2,5 |
| Куры-несушки, бройлеры | 2 – 3 мл на 1 л питьевой воды |
| Цыплята, ремонтный молодняк | 1 – 1,5 мл на 1 л питьевой воды |
| Собаки | 0,5 – 5 |
| Кошки, пушные звери | 0,5 – 2,5 |

При хроническом течении болезни назначают 1/2 дозы Катакюр, указанной в таблице. Повторный курс лечения при необходимости проводят с интервалом 5 – 14 дней.

16. Побочных явлений и осложнений при применении Катакюр в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается.

17. Симптомов передозировки при применении Катакюр в соответствии с настоящей инструкцией не выявлено.

18. Применение Катакюр не заменяет и не исключает использование антибактериальных и других средств этиотропной терапии.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении не установлено.

20. Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе по той же схеме.

21. Убой животных на мясо и использование в пищевых целях мяса, молока и яиц во время и после применения Катакюр разрешается на общих основаниях.

| | |
|---|--|
| Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения. | Ашиш Лайф Сайенс Пвт Лимитед, Плот номер J-137, M.I.D.C., Тарапур, Бойсар – 401501, Махараштра, Индия/AshishLifeSciencePvtLimited, PlotNo. J-137, M.I.D.C., Tarapur, Boisar – 401501, Maharashtra, India |
|---|--|

| | |
|---|---|
| Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя. | ООО "АЛС ЭНИМАЛ ХЕЛФ Рус, 117587, Россия, г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 2, оф. 541, тел./факс 8 (499) 550-31-60 |
|---|---|

Номер регистрационного удостоверения РК-ВП-4-2990-15 от 17.04.2015г.

