

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

Н. А. ВЛАСОВ

12.04.2016

ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата Катозал[®] для стимуляции обменных процессов и неспецифической резистентности у животных

(Организация-разработчик: компания «Bayer Animal Health GmbH»
Kaiser-Wilhelm-Allee 10, D-51373 Leverkusen, Германия)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Катозал[®] (Catosal[®]).
Международное непатентованное наименование: бутафосфан и цианокобаламин.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Катозал[®] в 100 мл в качестве действующих веществ содержит бутафосфан - 10,0 г, цианокобаламин - 0,005 г, а также вспомогательные вещества: спирт бутиловый, гидроксид натрия и воду для инъекций.

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость розового цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 5 лет со дня производства, после вскрытия флакона – в течение 28 суток.

Запрещается применение препарата Катозал[®] по истечении срока годности.

4. Выпускают лекарственный препарат расфасованным в стеклянные флаконы по 100 мл, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Флаконы поштучно упакованы в картонные коробки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят Катозал[®] в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5⁰С до 25⁰С.

6. Катозал[®] следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Катозал® относится к комплексным препаратам, предназначенных для стимуляции обменных процессов и неспецифической резистентности.

Катозал® обладает тонизирующими свойствами, нормализует метаболические и регенеративные процессы, оказывает стимулирующее влияние на белковый, углеводный и жировой обмен веществ, повышает резистентность организма к неблагоприятным факторам внешней среды, способствует росту и развитию животных.

10. Катозал® по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендованных дозах не оказывает местно-раздражающего, сенсibiliзирующего, эмбриотоксического, тератогенного, мутагенного и канцерогенного действия, не обладает кумулятивными свойствами.

III. Порядок применения

11. Катозал® назначают крупному и мелкому рогатому скоту, лошадям, свиньям, собакам, кошкам, пушным зверям и птице при нарушениях обмена веществ различной этиологии, а также в качестве стимулирующего и тонизирующего средства:

- для повышения сопротивляемости организма к заболеваниям различной этиологии;

- как дополнительное средство при лечении заболеваний, обусловленных недостаточностью в организме кальция и магния;

- при родах, а также в целях профилактики послеродовых осложнений (тетания, родильный парез);

- при тяжелых физических нагрузках и повышенной физической активности у спортивных лошадей (за 2 – 3 дня до соревнований).

12. Противопоказанием к применению препарата Катозал® является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

13. Катозал® применяют крупному и мелкому рогатому скоту, лошадям, свиньям, собакам, кошкам, пушным зверям один раз в сутки внутримышечно, подкожно или внутривенно (медленно), птице – перорально с водой для поения в течение 4 – 5 дней, в разовых дозах, указанных в таблице:

Вид животного	Доза (мл на животное)
Взрослые лошади и крупный рогатый скот	10,0-25,0
Жеребята, телята	5,0-12,0
Взрослые овцы и козы	2,5-8,0
Ягнята, козлята	1,5-2,5

Взрослые свиньи	2,5-10,0
Поросята-сосуны, подвинки	1,0-2,5
Куры-несушки, бройлеры	2,0-3,0 мл на 1 л питьевой воды
Цыплята, ремонтный молодняк	1,0-1,5 мл на 1 л питьевой воды
Собаки	0,5-5,0
Кошки, пушные звери	0,5-2,5

При хроническом течении болезни назначают $\frac{1}{2}$ дозы препарата Катозал[®], указанной в таблице. Повторный курс лечения при необходимости проводят с интервалом 5 – 14 дней.

14. Симптомов, возникающих при передозировке препарата, не установлено.

15. Особенности действия при первом применении лекарственного препарата или при его отмене не выявлено.

16. Катозал[®] разрешен к применению беременным и лактирующим животным.

17. Следует избегать пропуска очередного применения Катозал[®], так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередной дозы использование препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

18. Побочных явлений и осложнений при применении препарата Катозал[®] в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

19. Информация о взаимодействии препарата Катозал[®] с лекарственными препаратами других фармакологических групп и кормовыми добавками отсутствует.

20. Убой животных на мясо и использование в пищевых целях мясопродуктов, молока и яиц во время и после применения препарата Катозал[®] разрешается без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с препаратом Катозал[®] следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

22. Во время работы с препаратом не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Катозал®. При случайном попадании лекарственного препарата на кожу его необходимо немедленно смыть водой с мылом, при попадании в глаза - промыть их в течение нескольких минут проточной водой. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

«Bayer HealthCare LLC»; 12707, Shawnee Mission Parkway Shawnee, Kansas 66201-0390, (USA): производство и фасовка в первичную упаковку

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH; Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel (Germany): вторичная упаковка, выпускной контроль качества, ввод лекарственного препарата в гражданский оборот

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

АО «БАЙЕР»
Москва, 107113, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2;
тел. (495) 234-2000

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению препарата Катозал, утвержденная Россельхознадзором 31.08.2012 года.

Номер регистрационного удостоверения 276-3-18.12-3121 НПВЧ-3-0.2/101071