



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

Е.А. НЕПОКЛОНОВ

30 ИЮЛ 2014

ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата Байофлай® Пур-он для защиты крупного рогатого скота от двукрылых насекомых на пастбище (организация - разработчик компания «Bayer Animal Health GmbH», Германия)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Байофлай® Пур-он (Bayofly® Pour-on).

Международное непатентованное наименование: цифлутрин.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Байофлай® Пур-он в качестве действующего вещества в 100 мл содержит цифлутрин - 1,0 г, а также вспомогательные вещества: Солвессо 200 (комплексный растворитель из смеси углеводов) – 10 г, 2-октилдодеканол – 10 г и жидкий парафин – 65,78 г. По внешнему виду препарат представляет собой маслянистую прозрачную жидкость желто-коричневого цвета.

3. Выпускают Байофлай® Пур-он расфасованным по 500 мл в пластиковые бутылки с навинчиваемыми крышками-дозаторами.

4. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 8⁰ С до 25⁰ С.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 3 года со дня производства.

Запрещается применение Байофлай® Пур-она по истечении срока годности.

5. Байофлай® Пур-он следует хранить в недоступном для детей месте.

6. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

7. Байофлай® Пур-он относится к инсектоакарицидным препаратам группы синтетических пиретроидов.

Цифлутрин - (циано-4 (-флуоро-3-феноксифенил) - метил-3(2,2-дихлорозетенил)-2,2-диметил), входящий в состав препарата, обладает контактным инсектицидным и репеллентным действием в отношении двукрылых насекомых: мух, включая *Haematobia irritans*, *Haematobia stimulans*, *Musca autumnalis*, *Stomoxys calcitrans*, слепней (*Tabanidae*), оводов (*Hypodermatidae*), комаров (*Culicidae*) и мошек (*Simuliidae*).

Механизм его действия заключается в блокировании передачи нервных импульсов, что вызывает нарушение координации движений, паралич и гибель насекомых.

После нанесения на кожу препарат распределяется по поверхности тела, в незначительной степени резорбируется кожей, что обеспечивает его длительное инсектицидное и репеллентное действие.

Байофлай® Пур-он по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76): ЛД₅₀ при пероральном введении и

накожном нанесении белым мышам составляет более 5000 мг/кг массы животного. В рекомендуемой дозе не оказывает резорбтивно-токсического, эмбриотоксического, тератогенного, мутагенного, иммунотоксического и раздражающего действия на кожу; при попадании в глаза вызывает слабое раздражение. Препарат токсичен для пчел, а также рыб и других гидробионтов.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. Байофлай® Пур-он применяют для обработки крупного рогатого скота в пастбищный период в целях уничтожения зоофильных мух, слепней, оводов, комаров, мошек и защиты животных от их нападения.

9. Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата. Байофлай® Пур-он не следует применять животным массой менее 300 кг, а также наносить на влажную, поврежденную и загрязненную кожу.

10. Байофлай® Пур-он с помощью дозирующего устройства наносят на кожу спины вдоль позвоночника от холки до крестца, в дозе 2 мл на 100 кг массы животного (из расчета 0,2 мг цифлутрина на 1 кг массы).

Защитное действие препарата продолжается не менее 28 суток после однократной обработки. Обработку крупного рогатого скота в пастбищный период проводят один раз в 4-6 недель в зависимости от численности насекомых. Дойных коров следует обрабатывать сразу после дойки.

11. При передозировке препарата у животного может наблюдаться угнетенное состояние и снижение аппетита.

12. Особенности действия лекарственного препарата при первом применении и отмене не выявлено.

13. При обработке животных следует придерживаться рекомендуемого инструкцией интервала. При пропуске очередной обработки применение препарата возобновляют в той же дозе по той же схеме.

14. Побочных явлений и осложнений при применении Байофлай® Пур-она в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности к препарату и проявлении аллергических реакций препарат смывают водой с мылом и животному при необходимости назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

15. Байофлай® Пур-он не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными средствами для обработки животных.

16. Продукцию животноводства после применения Байофлай® Пур-она в соответствии с настоящей инструкцией разрешается использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

17. При работе с препаратом Байофлай® Пур-он следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Обработку животных следует проводить в спецодежде (халат, головной убор, резиновые сапоги, гигиенические перчатки) Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте с лекарственным препаратом с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Байофлай® Пур-оном. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

19. Пустую тару из-под препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель компания «Bayer Animal Health GmbH»;
Адрес места производства: KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH; Projensdorfer Str. 324,
D-24106 Kiel (Германия).

Инструкция разработана компанией «Bayer Animal Health GmbH» (Германия)
совместно с ЗАО «Байер» (123022, Москва, Б. Трехгорный пер., д.1, стр.1) .

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению
Байофлай® Пур-она, утвержденная Россельхознадзором 28 декабря 2011 года.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Номер регистрационного удостоверения