



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
 Россельхознадзора

Е.А. Непоклонов
22 ЯНВ 2013

ИНСТРУКЦИЯ

по применению вакцины ТОКСИПРА ПЛЮС инактивированной против энтеротоксемии, эмфизематозного карбункула и столбняка

(организация-разработчик: Лабораториос Хипра С.А.»/Laboratorios Hipra, S.A (Испания)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование лекарственного препарата - ТОКСИПРА ПЛЮС/ TOXIPRA PLUS

Международное непатентованное наименование - Вакцина инактивированная против энтеротоксемии, эмфизематозного карбункула и столбняка.

2. Лекарственная форма - супензия для инъекций.

Вакцина изготовлена из β - и ϵ -токсOIDов Clostridium perfringens типов B, C и D, α -токсOIDа Clostridium novyi тип B, α -токсOIDа Clostridium septicum, анакультуры Clostridium chauvoei, токсOIDа Clostridium tetani и вспомогательных компонентов: гидроксида алюминия 5 мг/мл, тиомерсала 0,1 мг/мл, воды для инъекций.

По внешнему виду вакцина представляет собой супензию желто-коричневого цвета.

Вакцина расфасована по 100 мл (50 доз) в стеклянные флаконы и по 250 мл (125 доз) в пластиковые флаконы соответствующей вместимости, герметично укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.

3. Флаконы с вакциной упакованы в картонные коробки. В каждую коробку вкладывают инструкцию по применению вакцины на русском языке.

Срок годности вакцины 24 месяца с даты выпуска, при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Запрещено использовать вакцину по истечении срока годности.

4. Вакцину хранят и транспортируют в сухом, темном месте при температуре от 2 °C до 8 °C.

5. Вакцину следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Вакцину во флаконах без маркировки, с нарушением целостности и/или герметичности укупорки, измененным внешним видом, истекшим сроком год-

ности, подвергшуюся замораживанию, а также не использованную в день вскрытия флакона, бракуют, обеззараживают кипчением в течение 30 минут и утилизируют. Утилизация обеззараженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

II.БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

7. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у животных к клостродиозам через 21 день после двукратного введения, который сохраняется у овец, коз и кроликов - 6 месяцев, у крупного рогатого скота - 12 месяцев.

В 2,0 мл вакцины содержится:

- β -токсOID *Clostridium perfringens* типов B, C и D ≥ 10 МЕ антитоксина β /мл сыворотки;
- ϵ -токсOID *Clostridium perfringens* типов B, C и D ≥ 5 МЕ антитоксина ϵ /мл сыворотки;
- α -токсOID *Clostridium novyi* типа B $\geq 3,5$ МЕ антитоксина α /мл сыворотки;
- α -токсOID *Clostridium septicum* $\geq 2,5$ МЕ антитоксина α /мл сыворотки;
- анакультура *Clostridium chauvoei* 100 % защита;
- токсOID *Clostridium tetani* $\geq 2,5$ МЕ антитоксина/мл сыворотки.

Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ.

8. Вакцина ТОКСИПРА ПЛЮС предназначена для профилактики:

- энтеротоксемии, некротического гепатита, эмфизематозного карбункула и столбняка у крупного рогатого скота и откормочных телят;
- геморрагического энтерита, энтеротоксемии и столбняка у подсосных телят;
- инфекционной анаэробной энтеротоксемии, некротического гепатита, эмфизематозного карбункула и столбняка у половозрелых овец и коз;
- анаэробной дизентерии, геморрагического энтерита, анаэробной энтеротоксемии, эмфизематозного карбункула и столбняка у ягнят и козлят;
- энтеротоксемии у кроликов.

9. Запрещено вакцинировать клинически больных и/или ослабленных животных и животных на поздних сроках беременности.

10. Вакцинации подлежат крупный рогатый скот, овцы, козы и кролики.

Вакцину вводят двукратно:

- взрослому крупному рогатому скоту и телятам на откорме в дозе 4 мл/животное с интервалом 20 - 25 дней. Ревакцинируют животных ежегодно однократно в дозе 4 мл.
- подсосным телятам - в дозе 2 мл с интервалом 20 - 25 дней.

- овцам и козам – в дозе 2 мл/животное с интервалом 20 - 25 дней. Ревакцинируют животных каждые 6 месяцев однократно в дозе 2 мл (весной и осенью).

- ягнятам и козлятам, начиная с 7-10 дневного возраста - в дозе 1 мл /животное с интервалом 20 - 25 дней. Молодняк, полученный от вакцинированных самок, вакцинируют с 3 - 4 недельного возраста.

- племенным кроликам, начиная с 2 месячного возраста - в дозе 0,5 мл с интервалом 21 день. Ревакцинируют животных в дозе 0,5 мл каждые 4 - 6 месяцев (весной и осенью).

- кроликам на откорме перед отъемом в дозе 0,2 мл/животное с интервалом 20 - 25 дней.

При выявлении в хозяйстве животных, больных энтеротоксемией, допускается ревакцинация всего поголовья через 8 - 10 дней в той же дозе.

Овцам и козам вакцину вводят только подкожно в область подгрудка, крупному рогатому скоту и кроликам - подкожно или внутримышечно в области шеи, подгрудка или задних конечностей.

11. Симптомов появления клостридиозов у животных при передозировке вакцины не установлено.

12. Особеностей постvakцинальных реакций при первичном и последующих введениях вакцины не установлено.

13. Следует избегать нарушений схемы и сроков введения вакцины, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики клостридиозов.

14. При применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается.

У отдельных животных после введения вакцины могут наблюдаться аллергические реакции. В таких случаях применяют антигистаминные средства.

15. Запрещается использовать вакцину совместно с другими иммунобиологическими препаратами.

16. Продукты убоя от вакцинированных животных, реализуют без ограничения независимо от сроков вакцинации.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

17. При работе с вакциной необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами для ветеринарного применения.

18. Лица, участвующие в проведении вакцинации, должны быть обеспечены спецодеждой (комбинезоны или халаты, сапоги, колпаки, резиновые перчатки) и очками закрытого типа. В местах работы должна быть аптечка доврачебной помощи.

19. При попадании вакцины на кожу или слизистые оболочки рекомендуется промыть их большим количеством чистой воды. В случае разлива вакци-

ны, зараженный участок пола или почвы заливают 5% раствором хлорамина или едкого натрия.

20. Наименование, адрес организации-производителя: фирма «Laboratorios Hipra, S.A.»/ «Лабораториос Хипра С.А.», Испания, Avda. La Selva, 135-17170 Amer (Girona), Spain).

Инструкция по применению вакцины ТОКСИПРА ПЛЮС инактивированной против энтеротоксемии, эмфизематозного карбункула и столбняка разработана фирмой «Лабораториос Хипра С.А», Испания, Avda. La Selva, 135-17170 Amer (Girona), Spain.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ "ВГНКИ"